

第2類医薬品

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

製酸薬

イグロン



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

胃腸鎮痛鎮痙薬

2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。

排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。

腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

[効能又は効果]

・胃痛、胸やけ、飲み過ぎ、胃酸过多、胃もたれ、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐

[用法及び用量]

食間および就寝前の空腹時に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	
小児（8歳以上15歳未満）	1/2包	3回
8歳未満は服用しないでください。		

<用法・用量に関する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分及び分量]

成人 1日量 3包中	分 量
無水リン酸水素カルシウム	1020mg
沈降炭酸カルシウム	1020mg
水酸化マグネシウム	960mg
銅クロロフィリンナトリウム	120mg
ロートエキス 3倍散	90mg

添加物としてトウモロコシデンプン、結晶セルロース、ケイヒ末、ポビドン、1-メントール、香料（ペパーミントコートン）を含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。

(4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

[お問い合わせ先]

本剤についてのお問い合わせは、お買い求め先または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

松本製薬工業株式会社「お客様相談窓口」

住 所 〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160

電 話 ☎ 0800-888-3197

受付時間：10:00～16:00（土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始を除く）

製造販売元

松本製薬工業株式会社

奈良県高市郡高取町車木323-1

08100032