

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

ガストール® アクティブ

第3類医薬品

胃腸薬 健胃成分配合

- 疲れや年齢などの影響により、胃の働きが弱ってくると、胃もたれや消化不良などの症状を引き起こします。
- ガストールアクティブは2種の胃粘膜修復成分が弱った胃を守り、3種の健胃成分が胃の働きを活発にすることで、あなたの弱った胃を元の状態に近づけます。最近感じるようになった胃もたれ・消化不良。そんな症状にガストールアクティブがよく効きます。
- サッと飲みやすい顆粒です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
- ② 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- ③ 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹

効能・効果

胃もたれ、食欲不振、消化不良、胃弱、胃部・腹部膨満感、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量

次の1回量を1日3回、食前又は食後に服用してください。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1包	×服用しないこと

<用法・用量に関連する注意> 用法・用量を厳守してください。

成分

3包(1日量)中

胃の働きを助ける	ケイヒ乾燥エキス	50mg(ケイヒ 1,100mgに相当)
	ソウジュツ乾燥エキス	60mg(ソウジュツ 600mgに相当)
	ホップ乾燥エキス	50mg(ホップ 700mgに相当)
胃粘膜を修復します	カンゾウエキス末	140mg(カンゾウ 980mgに相当)
	アズレンスルホン酸ナトリウム	6mg

添加物：無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ハッカ油、エリスリトール、アセスルファムK

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先
お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2
<https://www.ssp.co.jp/>