

第3類医薬品

ゆう こう がん
熊光丸

胸やけ、もたれ、胃弱、消化不良
飲み過ぎ、腹部膨満感

販売名：熊光丸

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

【用法・用量】

成人（15歳以上）…1回24丸 11歳以上15歳未満…1回16丸
 8歳以上11歳未満…1回12丸 5歳以上8歳未満…1回8丸
 3歳以上5歳未満…1回6丸 3歳未満は服用しないでください
 1日3回、食間に水又は白湯にて服用してください。

●用法・用量を厳守してください。●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。●3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

【成分・分量】 1日量(3包72丸)中

ケイヒ末……………900mg	カンゾウ末……………450mg
オウバク乾燥エキス…180mg	センブリエキス……180mg
(オウバク900mgに相当)	(センブリ900mgに相当)
動物胆（牛胆）………50mg	ユウタン……………5mg

添加物として、寒梅粉、米粉、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、薬用炭、ヒドロキシプロピルセルロース、サリチル酸、アラビアゴム、タルクを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。2.小児の手のとどかない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）4.1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。5.使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社廣貫堂 富山市梅沢町2丁目9-1
 （お客様相談窓口）電話 076-424-2259

副作用救済制度 ☎0120-149-931

希望小売価格 140円＋税 内容量24丸



使用期限