

[使用上の注意]

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地  
電話：0120-149-931

# 生薬配合胃腸薬

飲み過ぎ・二日酔  
のむかつき

パンクターゼ  
胃腸内服液

第2類  
医薬品

**[用法・用量]** 成人(15才以上)1回1本(30mL)を1日3回を限度として服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。  
○用法・用量を厳守してください。  
○小兒には服用させないでください。

**[効能]** 食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

お客様相談室 電話：0120-584-419  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

[成分・分量] 30mL中

ウイキョウエキス75mg、オウゴンエキス100mg、ケイヒ流エキス0.3mL、ゲンチアナ流エキス0.15mL、ショウキョウエキス15mg、チョウジチンキ0.1mL、チンピエキス50mg、ガジュツエキス10mg、ウコン流エキス0.5mL、カルニチン塩化物120mg  
添加物：センブリ流エキス、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、アルコール、安息香酸Na、パラベン、ポピドン、L-メントール、香料、グリセリン

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小兒の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。