

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

胃のもたれ、胸やけ、飲みすぎに **【健胃薬】** **【第2類医薬品】**

ストマパール健胃顆粒

現代は飽食の時代ともいわれ、食べすぎたり、飲みすぎたりしてしまう機会が多くあります。また疲労やストレスなどが誘因となって、胃腸の病気がおこることが知られています。

ストマパール健胃顆粒は胃の粘液量を増大させ胃粘膜を守るテプレノンの他、胃の働きを高め、胃もたれなどの自覚症状を緩和するソウジュツ乾燥エキス-S、コウボク乾燥エキス、胃粘膜を修復し、胃の痛みなどを緩和するカンソウエキスなど3種類の生薬エキスを配合した弱った胃の働きをよくする健胃薬です。

胃のもたれ・胸やけ・飲みすぎなどの症状がある時に服用をお勧めします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。

肝臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消 化 器	腹部膨満感、はきけ、腹痛
精神神経系	頭痛
そ の 他	皮下出血

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢、口のかわき

4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、はきけ（むかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、胸つかえ

■ 用法・用量

次の量を食後に水又はさ湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
小児（15才未満）	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を守ってください。

■ 成分・分量


成人(15才以上)1日量3包(4.5g)中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
テプレノン	112.5mg	胃の粘液量を増大させ、胃粘膜を守ります。
ソウジュツ乾燥エキス-S (原生薬としてソウジュツ)	150mg (1.5g)	胃の働きを高め、胃もたれなどの自覚症状を緩和します。
コウボク乾燥エキス (原生薬としてコウボク)	83.4mg (1.0g)	
カンゾウエキス (原生薬としてカンゾウ)	200mg (0.6g)	胃粘膜を修復し、胃の痛みなどを緩和します。

添加物として 無水ケイ酸、乳糖、D-マンニトール、CMC-Ca、l-メントール、ケイヒ末、トコフェロール酢酸エステル、香料、エタノール、トウモロコシデンプンを含んでいます。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果には変わりありません。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎06-6351-2100(代表) 受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)

発売元
 **奥田製薬株式会社**
大阪市北区天満1丁目4番5号
<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18