

服用に際しては説明書をよく読んでください

二日酔いのむかつき・飲み過ぎ・食べ過ぎ

JPS漢方胃腸内服液

第2類医薬品

【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

飲み過ぎ、食べ過ぎ、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、食欲不振、もたれ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃弱、嘔吐、消化不良

【用法・用量】

成人（15才以上）1回1本、1日3回食前又は食間に服用してください。

（15才未満は服用しないでください。）

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）定められた用法・用量を厳守してください。
- （2）食間とは食後2～3時間を指します。
- （3）生薬成分を配合しているため、経時的に沈殿いたしますが、薬効には支障がないのでよく振ってから服用してください。

【成分・分量】 1本（30mL）中に

水製乾燥エキス（Ⅰ） 0.3g （五苓散）（日局タクシャ0.833g、日局フクリョウ0.750g、日局ケイヒ0.500g、日局チョレイ0.750g、日局ビャクジュツ0.750gに相当）

水製乾燥エキス（Ⅱ） 0.3g （黄連解毒湯）（日局オウレン0.333g、日局オウバク0.333g、日局オウゴン0.500g、日局サンシシ0.333gに相当）

添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、ポリソルベート80、エタノール、その他2成分

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）封をあけたら飲みきってください。封をあけたまま保存しないでください。
- （5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

お客様相談室 電話 045-593-2136

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—