

本品には添付文書はありませんので、ラベルの画像を掲載します。

4987305 232465

新バッコ液[®]

二日酔いのむかつき・飲みすぎに

20mL

第2類医薬品

〔効能・効果〕
はきけ(二日酔い・悪酔いのむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、飲みすぎ、食べすぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、消化不良、食欲不振、胃弱、嘔吐。

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

12 - 1

製造販売元 全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

(用法・用量) 15才以上1回1びん、1日3回食後に服用します。
○生薬配合製剤ですので、よく振ってから服用してください。

(成分) (1びん20mL中) カンゾウ(甘草)エキス 125mg、ソウジュツ抽出液 2.33mL、オウレン抽出液 2.66mL、ケイヒ抽出液 3.66mL、チョウジ抽出液 0.24mL、コショウ抽出液 0.4mL、ゲンチアナ抽出液 1.33mL、アセニャク 66.66mg
添加物としてアルコール、安息香酸Na、クエン酸Na、グリセリン、パラベン、プロピレングリコール、l-メントール、香料、アマチャエキス、白糖、水アメを含有します。

(使用上の注意)
してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期運用しないこと。
相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。高血圧、腎臓病、心臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(保管及び取扱い上の注意)
(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意してください。

使用期限 (年,月)
製造番号