

販売名: 高砂オウレン

第2類医薬品

日本薬局方 **オウレン**

中国産

容量 500g 小口切



Lot

袋の裏面も必ずお読みください。



**高砂薬業株式会社**

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

### —— 保管及び取扱上の注意 ——

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  2. 小児の手の届かない所に保管してください。
  3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります)
  4. 気密な袋に脱酸素剤を入れて保存性を高めてありますが、開封するとその効果は失われますので、次の点に御注意ください。
    - なるべくお早めに御使用ください。
    - 輪ゴム、クリップ等で確実に封止して保管してください。  
(吸湿の防止・虫や異物混入の防止)
- ©万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

日本薬局方  
**オウレン**

第2類医薬品

高砂オウレン

### ⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5~6回、下痢に服用する場合は5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

### 【効能又は効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

### 【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1日量3gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

(食間とは、食後2~3時間)

**高砂薬業株式会社**

大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20  
お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)  
機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>