

第3類医薬品

日本薬局方
センブリ末

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

 使用上の注意



[相談すること]

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1カ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5~6回、止瀉で用いる場合は5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

<健胃の目的で用いる場合>

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

<止瀉の目的で用いる場合>

下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

用法・用量

<健胃の目的で用いる場合>

大人(15歳以上)は1回量0.015g、1日3回、食前又は食間に服用する。添付小さじ山盛0.015g

<止瀉の目的で用いる場合>

大人(15歳以上)は1回量0.3g、1日3回を限度として服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。添付さじ0.3g

保管および取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の下人になったり品質が変わることがあります)

※ 本品は生薬の粉末ですので、製品により粉末の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製造販売元:株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

電話:076-431-7017 FAX:076-431-7013

受付時間:午前9:00から午後4:30まで(土、日、祝日を除く)