

販売名:新バスゲン内服液プラス

〔成分・分量〕1回量(1本:30mL)中
 ウコン流エキス……………0.5mL
 (日局ウコン 500mg に相当)
 オウレン流エキス……………0.3mL
 (日局オウレン 300mg に相当)
 ニンジンエキス……………54mg
 (日局ニンジン 600mg に相当)
 チンピエキス……………100mg
 (日局チンピ 500mg に相当)
 ソウジュツ流エキス……………0.5mL
 (日局ソウジュツ 500mg に相当)
 ゲンチアナ流エキス……………0.15mL
 (日局ゲンチアナ 150mg に相当)
 日局ケイヒ油……………3mg
 添加物として β -メントール、エリスリトール、
 スクラロース、D-ソルビトール、安息香酸 Na、
 パラベン、アルコールを含有します。

・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1回1本(30mL)を
 1日3回を限度として服用する。
 ただし服用間隔は4時間以上おくこと。
 ・用法及び用量を厳守すること。

製造販売元 **Rinyo** 金陽製薬株式会社
 奈良県五條市住川町1420番地
 Tel. 0747-22-3451

使用期限

Lot No.

第3類医薬品

ラフェルサ®

二日酔いの むかつき

新バスゲン内服液プラス

生薬配合胃腸薬

**ウコン
配合**



30mL

〔使用上の注意〕【相談すること】

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 ・医師の治療を受けている人。
- 2.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

食欲不振(食欲減退)、
 胃部・腹部膨満感、消化
 不良、胃弱、食べ過ぎ(過
 食)、飲み過ぎ(過飲)、
 胸やけ、もたれ(胃もた
 れ)、胸つかえ、はきけ
 (むかつき、胃のむかつ
 き、二日酔・悪酔のむか
 つき、嘔気、悪心)、嘔吐

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)



ガラス:ピン、金属:キャップ