

この説明書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

第3類医薬品

胃腸薬

本家 東京 上野

寶丹「宝丹」

十四世 守田治兵衛



寶丹本家と寶丹の歴史

拙家は元、振津國佐吉郡我孫子より出て、江戸に薬業を開いたのは、延宝八年（一六八〇年）の昔であります。爾来十有四代相嗣ぎ今日に至り、東京に於て最古の歴史を有する薬舖であります。文久年間（一八六一—一八六二）、ある動機に因り、一種の処方箋を得た是は当時オランダの大医であるボードイン氏の方劑であります。此の稀有の処方箋を発見した当主は、これが煉丹精製の方法に苦心発明する処あり、以後数年これを種々の疾病に実験した結果、実に驚く可き偉効を奏することを認め遂に是を宝丹と命名けて発売するに至った次第であります。その当時偶々、諸種の悪疫流行し、殊に吐瀉病が甚しかったが、宝丹は是等の諸病を予防し、家庭に外出に救急の常備薬として広く賞用されるに至り明治十年西南戦役の際は、特に警視庁より軍旅必携薬として納入を命ぜられるの光榮に浴しました。爾来日清、日露両戦役及び青島戦役に至るまで絶えずその軍旅必携として重用せられて居ります。然し拙家は宝丹が斯る歴史を有することに満足するのではなく、代々の当主は、更に日に月に進歩する医薬の趨勢に順応し、方劑の改善に寢食を忘れて、宝丹の効力を更に増大することに苦心し何時の時代にも優越せる薬効を有して居ることは聊か宝丹の誇りと致す処であります。希くは、平素家庭に、外出に常に、是を備えて不時の疾病を救急せられんことを望みます。

使用上の注意



相談すること

- 一、次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談して下さい。
医師の治療を受けている人

《効能・効果》

胃もたれ、はきけ（むかつき）、二日酔い、悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、胸やけ、飲みすぎ、食べすぎ、嘔吐

《用法・用量》

食後または食間に服用して下さい。

年齢	一回量(添付のさじの量)	一日服用回数
大人(十五才以上)	〇.六六g(三杯)	三回
十一才以上十五才未満	〇.四四g(二杯)	
八才以上十一才未満	〇.三三g(一杯半)	
八才未満の乳幼児	服用しないこと	

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

さじの盛り方



《成分・分量》

一日量(二.九八g)中	
ℓーメントール……………	〇.〇九g
チクセツニンジン末……………	〇.三〇g
リン酸水素カルシウム……………	〇.六三g
	添加物としてハチミツを含む。
チヨウジ末……………	〇.一二g
沈降炭酸カルシウム……………	〇.六三g

《保管及び取扱上の注意》

- (一) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (二) 暖かい所に長く置きますと、針状の結晶または粉末が容器に付着することがありますが、これは成分の一部ですので服用にはさしさわりはありません。
- (三) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (四) 他の容器に入れ替えないで下さい。

お問い合わせ先

発売元 宝丹本舗 株式会社 守田治兵衛商店

東京都台東区上野二―十二―十一

電話：〇三(三八三二)〇五三九

HP: <http://www.morihoutan.com>

受付時間 十一時～十七時(土、日、祝日を除く)

製造販売元

三和薬品工業株式会社

大阪府東大阪市東石切町五一―二十

電話：〇七二(九八五)七一六一

受付時間 九時～十七時(土、日、祝日を除く)