

成分及び分量(2本(60mL)中)  
ゲンチアナ流エキス…0.6mL、ショウ  
キョウチンキ…0.8mL、蒼朮流エキス…  
1mL、人参エキス-P…30mg、延胡索乾  
燥エキス…60mg、カルニチン塩化物…  
120mg 添加物：白糖、クエン酸、ポリ  
オキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、  
安息香酸Na、パラベン、メントール

#### 効能又は効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、  
消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過  
ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、  
胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、  
二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

#### 用法及び用量

成人(15歳以上)は1回1瓶(30mL)を  
1日2回服用する。但し、服用間隔は4時  
間以上おくこと。

\* (1)用法及び用量を厳守して下さい。(2)  
15歳未満の小児は服用しないで下さい。  
(3)本剤は生薬成分を配合した内服液で  
すので、まれに沈澱を生じることがあります。  
よく振ってから服用して下さい。

#### お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社  
電話番号：06-6352-2381  
受付時間：9時から17時まで  
(土、日、祝日を除く)

発売元

**ゼネル薬品工業株式会社**  
大阪市北区天満3丁目6番1号  
製造販売元  
**ゼネル薬工粉河株式会社**  
和歌山県紀の川市粉河840番地



# ZENEL

## むかつき

## 胸やけ

## 胃のもたれ

## 二日酔

# イソロ<sup>®</sup> digestive

# 胃腸 ドロ リ ン グ S

# 液

第2類医薬品

## イソロ<sup>®</sup>胃腸ドリンクS

### △使用上の注意



#### ■相談すること

- 1.次の人は服用前に  
医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談して  
下さい。  
(1)医師の治療を受  
けている人。  
(2)2週間位服用して  
も症状がよくなりな  
い場合は服用を中止  
し、この製品を持っ  
て医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談し  
て下さい。

#### 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない  
涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)  
小児の手の届かない所に保管して下さい。  
(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤  
用の原因になったり品質が変わります)。(4)  
使用期限を過ぎた製品は服用しないで下  
さい。

副作用救済制度 電話 0120-149-931