



立 事 花 韭



大 仁 本

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1回量0.3g、1日3回、食前または食間に服用する。  
(食間とは…食後2~3時間を指します。)

【効能又は効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃のむかつき



内袋: PE,PET

(裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。)

第3類医薬品

日本薬局方

ケイヒ末

内容量 500g

Lot.



4 987716 127152

大晃生薬有限会社  
名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

# POWDER

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬有限公司 試験室

電話: フリーダイヤル 0120-335064

受付時間: 9時~12時, 13時~17時  
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話: フリーダイヤル 0120-149-931



## 使用上の注意

11

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヵ月位(胃のむかつきに服用する場合は5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。