

# 二日酔の むかつき

胃のもたれ

食欲不振


ウコン  
&  
カンゾウ  
配合

生薬配合胃腸薬  
イスタート  
胃腸内服液

第3類医薬品

イスタート胃腸内服液

第3類医薬品



【使用上の注意】

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、  
この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【成分・分量】

1日量(30mL×2本)中	
ウコン流エキス	0.4mL
(ウコンとして400mg)	
カンゾウエキス	150mg
(カンゾウとして600mg)	
ニンジンエキス	63mg
(ニンジンとして699.3mg)	
チンピエキス	140mg
(チンピとして700mg)	
ショウキョウ流エキス	0.4mL
(ショウキョウとして400mg)	
ソウジュツ流エキス	0.48mL
(ソウジュツとして480mg)	
カルニチン塩化物	120mg
添加物としてセンブリエキス、ハッカ油、 I-メントール、ポビドン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート 80、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、 安息香酸Na、白糖、プロピレングリコール、香料を含有します。	

## 【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐

## 【用法・用量】

成人(15歳以上) 1回1本(30mL)を1日2回服用してください。なお、服用間隔は、4時間以上おいてください。15歳未満は服用しないでください。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること

●保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。(4)表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

※本品は生薬が配合されていますので、まれに沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。



製造販売元

中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

02ISELAJ