

二日酔いのむかつき

胃のもたれ

食欲不振

30mL

生薬配合胃腸薬

ストック胃腸内服液

第3類医薬品

ウコン
カンゾウ
配合

ストック胃腸内服液

第3類医薬品

⚠ (使用上の注意)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 2週間連続服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2本)中
ウコン流エキス……………0.4mL
(ウコンとして400mg)
カンゾウエキス……………150mg
(カンゾウとして600mg)
ニンジンエキス……………63mg
(ニンジンとして699.3mg)
チンピエキス……………140mg
(チンピとして700mg)
ショウキョウ流エキス……0.4mL
(ショウキョウとして400mg)
ソウジヨク流エキス……0.48mL
(ソウジヨクとして480mg)

カルニチン塩化物……………120mg
添加物としてセンプリエキス、ハッカ油、
トメントール、ポリビドン、ポリオキシエ
チレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート
80、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、
安息香酸Na、白糖、プロピレングリコ
ール、香料を含有します。

ガラス：ビン

金属：キャップ

製造販売元 中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

【効能・効果】
食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部
膨満感、消化不良、胃痛、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、嘔
吐、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、
はきけ(むかつき)、胃のむかつき、
二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、
悪心、嘔吐

【用法・用量】
成人(15歳以上)1回1本(30mL)
を1日2回服用してください。なお、
服用間隔は、4時間以上おしえてく
ださい。15歳未満は服用しない
てください。

＜用法・用量に関連する注意＞
用法・用量を厳守すること

●保蔵及び取扱い上の注意(1)直射日光の当たらない
涼風の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届
かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)表示の使用
期限を過ぎた製品は服用しないこと。
※本品は生薬が配合されていますので、まれに沈殿を生じ
ることがあります。よく振ってから服用してください。

02STELCO 製造番号



中外医薬生産株式会社

使用期限

