

Pure Drugs

第2類医薬品

日本薬局方 オウレン末
ナカジマ

オウレン末
500g

Lot .

4 936246 100937

使用期限

副作用救済制度 TEL0120-149-931

製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
電話075(231)2633代

NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.

日本薬局方 オウレン末

第2類医薬品

ナカジマ オウレン末

9

4 936246 100784

使用期限 Lot .

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 オウレン末
ナカジマ オウレン末

第2類医薬品

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位：皮膚 症状：発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヵ月位（食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回、下痢に服用する場合は5～6日間）服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部腹部膨脹感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

用法及び用量

大人（15歳以上）は1回0.5gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ②小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- ④本品は防虫、防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意ください。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 ☎075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931