

日本薬局方 ケイヒ末
ナカジマ ケイヒ末

第3類医薬品



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（胃のむかつきに服用する場合は5～6回）服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部腹部膨脹感、消化不良、胃のむかつき。

用法及び用量

大人（15歳以上）は1回0.3gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ②小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ③誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- ④本品は防虫、防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意下さい。
- ⑤ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 075-231-2633

副作用被害救済制度 0120-149-931