




日本薬局方 センブリ

生

第3類医薬品

ナカジマ センブリ



4 936246 103990

500g

Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさげ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造販売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センブリ
ナカジマ センブリ

使用上の注意

第3類医薬品

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 1ヵ月位（食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

服用の際は、用法・用量を守って下さい

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部腹部、膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法及び用量

大人（15才以上）は1日1.5gを水300mlで約半量になるまで煮詰め滓を取り去り、食前又は食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児び手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさげ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさげ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。
4. 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入していますのでこれを一緒に煎じないようにご注意下さい。
5. ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

製造販売元 中嶋生薬株式会社

TEL. 075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931