

日本薬局方 センブリ末

第3類医薬品

ナカジマ センブリ末

250g

4936246 100517 Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

Pure Drugs

第3類医薬品

日本薬局方 センブリ末
ナカジマ

センブリ末
500g

Lot.

4936246 104003
使用期限 2020.03
副作用救済制度 TEL0120-149-931

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
電話075(231)2633(代)

NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.

日本薬局方 センブリ末

第3類医薬品

ナカジマ センブリ末

100g

4936246 100500 Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センブリ末

第3類医薬品

ナカジマ センブリ末

200g

4936246 110806 Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 センブリ末

ナカジマ センブリ末
当薬末 第3類医薬品

用法及び用量

〔健胃の目的で用いる場合〕
大人(15才以上)は1回0.015gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。

〔止瀉の目的で用いる場合〕
大人(15才以上)は1回0.3g1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4時間以上おいて下さい。添付のサジ1杯約0.03g

効能又は効果

〔健胃の目的で用いる場合〕
胃弱、食欲不振、胃部腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

〔止瀉の目的で用いる場合〕
下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

使用上の注意

- 医師の治療を受けている人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
- 服用に際して定められた用法・用量を守ってください。
- 1ヵ月服用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。