

健胃消化薬

ウルソデオキシ + 健胃生薬
コール酸

食べすぎ、むかつき、消化不良

嘔吐。
二日酔・悪酔いのむかつき、
腹部膨満感、胃弱、飲み過ぎ、
胸やけ、はきけ（胃のむかつき、

御
百
草
丸
U

おひやくそうがん ユウ

消化促進、消化不良、食欲不振
（食欲減退）、食べ過ぎ、胃もたれ、
胸つかえ、消化不良による胃部・

効能・効果

第2類医薬品

**使用上の注意****相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈用法・用量〉

15歳以上……………1回10丸 11歳未満8歳以上……………1回5丸
 15歳未満11歳以上……………1回 6丸
 1日3回、食前または食間に水または白湯(湯ざまし)にて服用してください。

用法・用量に関連する注意 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量〉1日量(30丸)中

ウルソデオキシコール酸 …… 60mg	センブリ末…………… 50mg
オウバク軟エキス …… 1,015mg	ゲンノショウコ末……………340mg
オウレン末 …… 200mg	エンゴサク末 …… 200mg
オウゴン末 …… 200mg	添加物…薬用炭、セラック

保管及び取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

1包(10丸) ¥120+税

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



製造販売元
 二反田薬品工業株式会社
 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号
 お問い合わせ先 TEL.0823(31)1515

使用期限

PE,セロハン