

日本薬局方

センブリ

販売名 山本漢方せんぶり

【特徴】

本品は生薬の煎じ薬（ティーバッグタイプ）です。

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- 1ヵ月位（食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電話 0568-73-3131

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）
<https://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

効能又は効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法及び用量

年齢	1日量	服用回数
大人 (15歳以上)	0.8g	1日3回を限度とする。

大人（15歳以上）は、1日量0.8g（1包）を水約300mLをもって煮て、約150mLに煮つめ、カスを取り去り、食前又は食間3回に分服する。あるいは熱湯中に浸して振りだし、その振出液を服用する。

（注意）

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 1包(0.8g)中

成分	分量	作用
日本薬局方 センブリ	0.8g	センブリ中の苦味配糖体が食欲の増進をうながす。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【内容量】 4.0g(0.8g×5包)

【その他】

○センブリの煎じ方（大人15才以上）
土ピンかヤカン（アルミ製、ステンレス製）にて水約300mLの中へ、本品1包を入れ、中の煎剤が軽く泡立ち程度の弱火にて、約150mLになるまで（約10～15分）煎じて、火を止め、袋を取り出してください。または湯呑み茶碗などの中へ本品1包を入れ、上から熱湯を注ぎ、よく振りだして、その振出液をお飲みください。

○本品を煎じた後の保管
夏期は、長時間煎液を放置しますと、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。