

第3類医薬品

30mL×2

二日酔のむかつき 食べすぎ・胸やけ

8種類の生薬配合!

生薬製剤

イストサン 胃腸内服液

第3類医薬品

販売名:
イストサン胃腸内服液

[用法・用量]

次の1回量を服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1びん (30mL)	1日2回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感、消化不良、食欲不振(食欲減退)、胃弱

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

▲
押し開けてください

30mL×2

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[成分・分量] 1びん(30mL)中

オウレン流エキス……………150μL (原生薬換算量 150mg)
 ゲンチアナ流エキス……………300μL (原生薬換算量 300mg)
 ソウジュツ流エキス……………300μL (原生薬換算量 300mg)
 ケイヒチンキ……………250μL (原生薬換算量 50mg)
 チョウジチンキ……………150μL (原生薬換算量 45mg)
 カンゾウエキス……………120mg (原生薬換算量 480mg)
 ホップ乾燥エキス……………25mg (原生薬換算量 350mg)
 コウジン乾燥エキス……………25mg (原生薬換算量 250mg)

添加物:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、デヒドロ酢酸Na、香料、
L-メントール、炭酸水素Na、エタノール、センプリエキス、白糖

<成分・分量に関連する注意>
生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
 電話: 0120-149-931

米田薬品株式会社
 大阪市浪速区塩草3丁目2-2
 お客様相談窓口
 電話 06-6562-7411
 受付時間 10:00~17:00
 (土、日、祝日を除く)