

第3類医薬品



むかつき 二日酔いの

飲みすぎ・胸やけ

スーツとした爽快感!

8種類の 生薬配合

イチコールド胃腸内服液
30mL



第3類医薬品

販売名:

イチコールド胃腸内服液

[用法・用量]

次の1回量を服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1びん (30mL)	1日2回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感、消化不良、食欲不振(食欲減退)、胃弱

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】 1びん(30mL)中

オウレン流エキス	150 μ L	(原生薬換算量 150mg)
ゲンチアナ流エキス	300 μ L	(原生薬換算量 300mg)
ソウジュツ流エキス	300 μ L	(原生薬換算量 300mg)
ケイヒチンキ	250 μ L	(原生薬換算量 50mg)
チョウジチンキ	150 μ L	(原生薬換算量 45mg)
カンゾウエキス	120mg	(原生薬換算量 480mg)
ホップ乾燥エキス	25mg	(原生薬換算量 350mg)
コウジン乾燥エキス	25mg	(原生薬換算量 250mg)

添加物:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、デヒドロ酢酸Na、香料、L-メントール、炭酸水素Na、エタノール、センブリエキス、白糖

<成分・分量に関連する注意>

生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話:0120-149-931

米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2
お客様相談窓口
電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

スーツとした 爽快感!

二日酔いの むかつき 飲みすぎ・胸やけ

8種類の 生薬配合

