

第3類医薬品

日本薬局方 センブリ トチモトのセンブリP

製造番号
使用期限

相談すること

【使用上の注意】

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 1ヵ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

【用法・用量】 大人(15歳以上)は1日量1.5gを、水約300mlで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振り出し、その振出液を服用してください。
・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

株式会社 杉本天海堂

[脱酸素剤入]

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

