

第3類医薬品

《日本薬局方センブリ末》

トチモトの

センブリ末P

内容量500g

【使用上の注意】裏面をよくお読み下さい。

【成分及び分量又は本質】

1日量(0.9g)中 日本薬局方センブリ末0.9g

【効能又は効果】

〈健胃の目的で用いる場合〉胃弱、食欲不振、胃部・腹部
膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

〈止瀉の目的で用いる場合〉

下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

【用法及び用量】

〈健胃の目的で用いる場合〉大人(15歳以上)は1回量
0.015g、1日3回、食前または食間に服用して下さい。

〈止瀉の目的で用いる場合〉大人(15歳以上)は1回量
0.3g、1日3回を限度とし服用して下さい。服用間隔
は4時間以上おいてください。(添付のさじ1杯0.015g)

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。



副作用被害救済制度

☎0120-149-931

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ
- 1ヵ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回、止瀉で用いる場合は5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ◎ 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造番号

[脱酸素剤入]

使用期限

株式会社 **橋本天海堂**

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

第3類医薬品

日本薬局方

センブリ末

TOCHIMOTO

50g

第3類医薬品

日本薬局方 センブリ末

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 1ヵ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回、止瀉で用いる場合は5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 〈健胃の目的で用いる場合〉胃痛、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき
- 〈止瀉の目的で用いる場合〉下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

【用法・用量】

- 〈健胃の目的で用いる場合〉大人(15歳以上)は1回量0.015g、1日3回、食前または食間に服用してください。(添付のサジ1杯で約0.015g)
- 〈止瀉の目的で用いる場合〉大人(15歳以上)は1回量0.3g、1日3回を限度とし服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。
- ・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ◎品質には細心の注意を払っておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造番号

使用期限

株式会社 橋本天海堂

【お客様相談窓口】 TEL 06(7711)0730