

① ② ③ ④ ⑤  
⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

生薬製剤

## 薬草健胃薬F

内服液

- 二日酔いのむかつき
- 消化不良
- 食欲不振

第2類  
医薬品



紙

お問い合わせ先  
株式会社富士薬品 (OTC学術室)  
電話 (048) 648-1118  
9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

△(使用上の注意)

※(守らないと病状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

■(相談すること)

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 高齢者 (3) 次の症状のある人：むくみ  
(4) 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病、心臓病
- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は  
副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師  
の診察を受けてください。  
偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つばり  
感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
- 2週間以上服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持っ  
て医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】 1日量 1本 (30mL) 中

オウバクエキス	100mg (原生薬換算量：300mg)
ケイヒエキス	45mg (原生薬換算量：1,000mg)
ワイキョウエキス	31.5mg (原生薬換算量：300mg)
カンゾウエキス	250mg (原生薬換算量：1,000mg)
ニンジンエキス	120mg (原生薬換算量：604mg)
ショウキョウエキス	58.2mg (原生薬換算量：600mg)
ゲンチアナエキス	22.5mg (原生薬換算量：150mg)

添加剤：D-ソルビトール液、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン  
ポリオキシプロピレングリコール、エタノール、l-メントール、香料、プロ  
ピレングリコール 含有

【用法・用量】

- 成人 1日1回1本を食後に服用してください。  
○ 定められた用法・用量をお守りください。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部：腹部膨満感、消化不良、胃痛、食べ過ぎ(過食)、  
飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、ほきけ(むかつき)、  
胃のむかつき、二日酔い、悪酔いのむかつき、嘔気、悪心、嘔吐

【保管及び取扱い上の注意】

- 服用に際しては、説明文をよくお読みください。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管してください。
- 1児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(原用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤は生薬成分を配合しているため、多少沈殿を生じることがありますが、  
薬効には支障ありません。よく振って服用してください。
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

AS04



30mL × 2本

二日酔いのむかつき・消化不良・食欲不振

生薬製剤

# 薬草健胃薬F

内服液

第2類医薬品

30mL×2

二日酔いのむかつき・消化不良・食欲不振

生薬製剤

30mL×2

# 薬草健胃薬F

内服液

第2類医薬品



製造販売元  
**株式会社 富士薬品**  
埼玉県さいたま市大宮区榎木町4丁目383番地

配置期限  
Lot.