

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【胃腸薬】

温石錠[®]

第3類医薬品

- ◆ 温石錠は、食欲不振・胃弱・胃もたれなどの症状を改善するために考えられた生薬製剤です。
- ◆ 温石錠の牛胆は胆汁の分泌を促進させて消化吸収を盛んにします。ニンジンは胃腸を活発にし、ビャクジュツ・カンゾウ・ショウキョウは胃腸の機能を調節するように働きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気^{a)}、恶心)、嘔吐
a)嘔氣：はきけのことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-------|---------|--------|
| 大人 | 2錠 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



成分・分量

本剤 6錠(1290mg)中

| | | | |
|------------|-------|------------|------|
| カンゾウエキス末 | 75mg | ピヤクジュツエキス末 | 60mg |
| ショウキョウエキス末 | 30mg | 牛胆 | 75mg |
| ニンジンエキス末 | 100mg | | |

添加物として赤色3号、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、パレイショデンプン、ヒドロキシプロビルセルロース、ヒプロメロースを含有する。

- ・本剤は淡紅白色で、特異なにおいを有し、味は初めなく後苦いフィルムコート錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 錠剤に水分が付くと、表面のフィルムコートが溶けますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにして下さい。

薬と養生

温石錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号