

第3類医薬品

食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃弱

薬草健胃薬

内服液 30mL

HERB STOMACHIC

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
・医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

はさけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・寒酔のむかつき、嘔気、悪心)、食べ過ぎ、食欲不振(食欲減退)、胃痛、消化不良、嘔吐、飲み過ぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を食後服用する。

●用法及び用量を厳守すること。

●生薬成分を含むため、わずかに沈殿を生じることがありますが薬効に変わりありません。よく振って服用すること。

金 属：キャップ

ガラス：瓶

【成分・分量】1日量1本(30mL)中
オウバクエキス…100mg(オウバク300mgに相当)、ケイヒエキス…45mg(ケイヒ1000mgに相当)、ウイキョウエキス…31.5mg(ウイキョウ300mgに相当)、カンゾウエキス…200mg(カンゾウ800mgに相当)、ニンジンエキス…60mg(ニンジン667mgに相当)、ショウキョウエキス…58.2mg(ショウキョウ600mgに相当) 添加物
ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、L-メントール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、D-ソルビトール、ブドウ糖果糖液糖、バニリン

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

AL04

使用
期限

製造
番号

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
● 医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、食べ過ぎ、食欲不振(食欲減退)、胃弱、消化不良、嘔吐、飲み過ぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を食後服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 生薬成分を含むため、わずかに洗眼を生じることがありますが薬効に変わりありません。よく振って服用すること。

AL04

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

金 属:キャップ ガラス:瓶

30mL
¥400+税

胃弱、消化不良、はきけ
(二日酔・悪酔のむかつき)

薬草健胃薬

内服液
30mL

第3類医薬品

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50
〈お客様相談室〉06-6203-5151
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

【成分・分量】1日量1本(30mL)中

オウバクエキス…100mg(オウバク300mgに相当)、ケイヒエキス…45mg(ケイヒ1000mgに相当)、ウイキョウエキス…31.5mg(ウイキョウ300mgに相当)、カンゾウエキス…200mg(カンゾウ800mgに相当)、ニンジンエキス…60mg(ニンジン667mgに相当)、ショウキョウエキス…58.2mg(ショウキョウ600mgに相当) 添加物:ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、メントール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、D-ソルビトール、ブドウ糖果糖液糖、バニリン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

使用
期限

製造
番号

販売名:薬草健胃薬

【使用上の注意】

相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
・医師の治療を受けている人。
- 2.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、食べ過ぎ、食欲不振(食欲減退)、胃弱、消化不良、嘔吐、飲み過ぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を食後服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 生薬成分を含むため、わずかに沈殿を生じることがありますが薬効に変わりありません。よく振って服用すること。 TL04

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

薬草健胃薬 液

内服

生薬配合

1日1回1本
食後に

30mL

第3類
医薬品

飲み過ぎ 胸やけ
胃のもたれに

【成分・分量】 1日量1本(30mL)中
オウバクエキス…100mg(オウバク300mgに相当)、ケイヒエキス…45mg(ケイヒ1000mgに相当)、ウイキョウエキス…31.5mg(ウイキョウ300mgに相当)、カンゾウエキス…200mg(カンゾウ800mgに相当)、ニンジンエキス…60mg(ニンジン667mgに相当)、ショウキョウエキス…58.2mg(ショウキョウ600mgに相当) 添加物:ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、L-メントール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、D-ソルビトール、ブドウ糖果糖液糖、バニリン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

金属:キャップ ガラス:瓶

配置
期限

製造
番号