

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

気になる 腸の老廃物に※ クレンジル®

※腐敗物質を含む滞留便や、腸内ガスなど

販売名: クレンジル

整腸薬 第2類医薬品

製品特徴

1. 薬用炭の細孔に腐敗物質や腸内ガスなどの老廃物を吸着します
2. 4種類の生薬が、老廃物を吸着した薬用炭と便と一緒に排出、お腹の調子を整えます



⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (5) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
下痢
4. 2週間くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

便秘、整腸(便通を整える)、軟便、胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量

次の量を食前または食後に水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3カプセル	3回
11才以上15才未満	2カプセル	
11才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量

1日量(9カプセル)中

アカメガシワエキス……………0.5g(原生薬換算量 5g)
ゲンノショウコエキス……………0.2g(原生薬換算量 2g)
アロエ末……………0.15g
ダイオウエキス……………20mg(原生薬換算量 0.2g)
薬用炭……………0.4g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、セルロース、リン酸水素Ca、タルク、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、サフラワー油、メタクリル酸コポリマーL、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有する

- 本剤は天然物(生薬)を用いているため、カプセル内容物の色が多少異なることがあります
また、白い斑点が見られることがあります。添加物によるものです
- 薬用炭などの有効成分により便が変色することがありますが、心配ありません

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- アルミ袋およびPTPシートが収縮していることがありますが、品質上問題ありません

<カプセルの取り出し方>

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる)



製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川 1-30-3