

服用前に、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。


ビオフィルミン[®]VC

ビフィズス菌・乳酸菌と3種のビタミン配合〈整腸薬〉

第3類医薬品

特 徴

- ビフィズス菌・乳酸菌、
ビタミンC・B₂・B₆を配合
- 悪玉菌を減らして腸内環境を整える
- 飲みやすいサイズで
レモンカラーのタブレット



⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
フェニルケトン尿症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消 化 器	吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効 能

整腸（便通を整える）、便秘、腹部膨満感、軟便

用 法 ・ 用 量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
成人 (15才以上)	2 錠	1 日 3 回
15 才 未 満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

成 分

6錠中

成 分	分 量
ビフィズス菌	18mg
ラクトミン(乳酸菌)	18mg
ビタミンC (アスコルビン酸)	500mg
ビタミンB ₂ (リボフラビン)	6mg
ビタミンB ₆ (ピリドキシン塩酸塩)	12mg

添加物：トウモロコシデンプン、還元麦芽糖水アメ、カルメロースカルシウム、エリスリトール、ステアリン酸マグネシウム、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、無水ケイ酸

<成分に関連する注意>

- (1) 尿および大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせてください。（尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがあります）
- (2) 本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂（リボフラビン）によるものですのでご心配ありません。
- (3) 錠剤により成分のビタミンB₂（リボフラビン）による赤い斑点がみられることがあります。効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) びんの中の詰め物は、キャップをあげた後は捨ててください。（この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、湿気を含み品質が変わったり、異物混入の原因になることがあります）
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。（品質保持のため）
- (6) 服用のつどキャップをしっかりとめてください。（他のにおいが移ったり、吸湿し品質が変わることがあります）
- (7) 箱とびんの「開封年月日」記入欄に、びんを開封した日付を記入してください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00（土、日、祝日を除く）

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

製造販売元 **バイオフェルミン製薬株式会社** 販売元 **大正製薬株式会社**

神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

東京都豊島区高田3丁目24番1号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）