



日本薬局方

ケツメイシ

第3類医薬品

ナカジマ ケツメイシ



4 936246 100067

9

Lot.

使用期限

副作用救済制度 TEL0120-149-931



【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさげ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ケツメイシ  
ナカジマ ケツメイシ

使用上の注意

第3類医薬品

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果

整腸（便通を整える）、便秘、腹部膨満感

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日量10グラムを約600mlの水で煮て約400mlになるまで煮つめ、滓をこして取り去り、食前又は食間3回に分けて服用してください。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさげ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさげ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。
4. 本品には、防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますので、これを一緒に煎じないようにご注意ください。
5. ご購入の際、万一異変がありましたら、お手数ですがお知らせください。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

製造販売元 中嶋生薬株式会社

TEL. 075-231-2633