

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

消化整腸系胃腸薬

パンクターゼ錠A

第3類医薬品


胃腸は、食べ物を消化吸収し栄養分を体内へ供給する大切な臓器です。この機能が衰えると、消化不良、食欲不振、もたれなど不快な症状を生じることがあります。パンクターゼ錠Aは、弱った胃の機能の衰えを助け、改善する消化酵素剤・健胃生薬・整腸剤などを配合した胃腸薬で、消化促進、消化不良、食欲不振、もたれや整腸（便通を整える）に効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能

消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲みすぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき）、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘

用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	3錠	1日3回、食前又は食後に服用してください。
8才～14才	2錠	
5才～7才	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

裏面もお読みください

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

9錠中

成分名		分量	作用
消化酵素剤	バイオアスターゼ2000	180mg	炭水化物、脂肪、たんぱく質の消化吸収を助け、胃腸の負担をすみやかに軽減します。
	膵臓性消化酵素TA	60mg	
	リパーゼAP6	60mg	
	プロザイム6	30mg	
整腸剤	有孢子性乳酸菌	60mg	乳酸菌が腸で繁殖して、腐敗菌などの有害な細菌の増殖をおさえ腸の働きを整えます。
粘膜修復剤	カンゾウ末	225mg	荒れた胃壁を保護・修復します。
健胃生薬	ガジュツ末	210mg	芳香性・辛味性・苦味性の健胃生薬の働きにより、消化液の分泌を促進し、弱った胃の働きを活発にします。
	ケイヒ末	210mg	
	ゲンチアナ末	120mg	
	ショウキョウ末	75mg	
制酸剤	炭酸マグネシウム	300mg	過剰の胃酸を中和するとともに、消化酵素の働きやすい状態をつくります。
	沈降炭酸カルシウム	360mg	

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、セルロース、デキストリン、乳糖水和物

<成分・分量に関連する注意>

本剤の成分には生薬が含まれていますので、製品により錠剤の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：058-278-3933
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鷲1丁目139番地