

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。
また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

胃腸薬

食べすぎ、もたれ、消化不良に

第3類医薬品

ガロール

製品の特徴

胃腸のはたらきは、食事から摂った食物を胃液や胆汁、消化酵素によって消化し、栄養素として吸収を行うことです。疲れや老化などで胃腸機能が低下し、胃酸や膵臓からの消化酵素、胆汁の分泌が低下すると消化力が低下し、栄養素が体内に吸収されにくくなります。

ガロールは、消化を高め、胃腸のはたらきを助ける胃腸薬で、消化不良や食欲不振を改善します。また、もたれ、食べ過ぎなどで疲れた胃腸にはたらき、胃腸の元気を応援します。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能効果

消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べすぎ（過食）、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感。

用法用量

次の1回量を1日3回 食後に服用する。

| 年 令 | 1回量 |
|-------------|---------|
| 成人（15才以上） | 5錠 |
| 11才以上 15才未満 | 4錠 |
| 8才以上 11才未満 | 3錠 |
| 5才以上 8才未満 | 2錠 |
| 5才未満 | 服用しないこと |

〈用法用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分分量

15錠（成人1日量）中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|--------------|-------|--|
| 胆汁末 | 300mg | 動物の胆汁を濃縮したもので、胃腸のはたらきをよくし、消化液の分泌を高めます。特に食事時の脂肪の消化を助け、胃もたれなどを緩和します。 |
| ビオチアスターゼ2000 | 45mg | デンプンやたんぱく質の消化酵素で、消化不良、食べ過ぎなどを解消します。 |

添加物として乳糖水和物、ヒドロキシプロピルスターチ、香料、ケイ酸Al、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含有する。

保管および取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 水分が付いた錠剤は、瓶に戻さないこと（変色の原因になったり品質が変わる）。
5. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 健創製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3527-3690
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
（土・日・祝日を除く）

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931