

添付文書をよく読むこと。
また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

胃腸薬

胃もたれ・消化を助ける・食欲が出ない

第3類医薬品

ガロール®

製品の特徴

胃腸のはたらきのひとつは、食事から摂った食物を胃液や胆汁、消化酵素によって消化し、栄養素として吸収を行うことです。胃酸や膵臓からの消化酵素、胆汁の分泌が低下すると消化力が低下し、栄養素が体内に吸収されにくくなります。

ガロールは、消化を高め、消化不良や食欲不振を改善します。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べすぎ（過食）、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感。

用法・用量

次の1回量を1日3回 食後に服用する。

年 令	1回量
成人（15才以上）	5錠
11才以上 15才未満	4錠
8才以上 11才未満	3錠
5才以上 8才未満	2錠
5才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分分量

15錠（成人1日量）中

成 分	分量	は た ら き
胆汁末	300mg	動物の胆汁を濃縮したもので、脂肪の消化を助けます。
ビオチン2000	45mg	でんぷん及びたん白質を消化します。

添加物として乳糖水和物、ヒドロキシプロピルスターチ、香料、ケイ酸Al、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、L-メントール、アラビアガム、デキストリン、食用油脂を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) 水分が付いた錠剤は、瓶に戻さないこと（変色の原因になったり品質が変わる）。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3527-3690
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9：00～17：50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <https://www.zeria.co.jp/>

*



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931