

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

飲みすぎ・胸やけ・胃の不快感に

太田胃散〈分包〉S

第2類医薬品



芳香性健胃消化薬

自然(生薬)の良さを生かした胃腸薬



特 徴

太田胃散〈分包〉Sは、自然由来の健胃生薬に制酸剤と消化酵素をバランスよく配合した、粉末タイプ(散剤)の胃腸薬です。

✧ 健胃生薬が胃の働きを改善

効果的に配合した7種の健胃生薬が弱った胃の働きを良好にし、飲みすぎ、胃もたれなどの胃の不快感な症状や食欲不振を改善します。

✧ 制酸剤が胃の中の酸度を調整

3種の作用の異なる制酸剤が出過ぎた胃酸を中和し、胃酸逆流に伴う胸やけ、胃痛などにすぐれた効果をあらわすとともに、消化酵素を働きやすくします。

✧ 粉末へのこだわり

生薬特有の芳香、味、効きめを生かすために、独自の製法で粉末(散剤)としています。生薬と1-メントールがスーツとした爽快な服用感をもたらします。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

透析療法を受けている人。

2. 長期連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 次の診断を受けた人。

腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

飲みすぎ、胸やけ、胃部不快感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、消化不良、消化促進、食欲不振、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重



太田胃散

裏面に続きます

用法・用量

次の量を食後又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包 	3 回
8～14歳	1/2 包 	
8歳未満	服用しないこと	



※食間とは食後2～3時間のことをいいます。

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

～散剤がのみにくい場合～

- ①適量の水又はぬるま湯を口を含み、薬を口の中に入れます。
- ②舌で2～3回混ぜてからのみますと、服用しやすくなります。

成 分 1日量(3包)中

成 分		分 量	主 な 作 用
健胃生薬	ケイヒ	276 mg	各生薬の芳香や苦味などが胃の働きを良好にし、胃液の分泌を調整したり、弱った胃の働きを改善します。
	ウイキョウ	72 mg	
	ニクズク	60 mg	
	チョウジ	36 mg	
	チンピ	66 mg	
	ゲンチアナ	45 mg	
	ニガキ末	45 mg	
制 酸 剤	炭酸水素ナトリウム	1,875 mg	速効性、持続性、遅効性など作用の異なる各制酸剤が出過ぎた胃酸を中和し、胃の中の酸度を調整します。
	沈降炭酸カルシウム	980 mg	
	合成ヒドロタルサイト	300 mg	
消化酵素	バイオヂアスターゼ	135 mg	主にでんぷん(炭水化物)やたん白質などの消化を助けます。

〔添加物〕 l-メントール、炭酸Mg

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

包 装 18包・34包・50包(分包タイプ)、80g・150g(缶入り)

姉妹品の紹介(目的に合わせてご利用ください。)

胃のもたれ・食べすぎに小粒でのみやすい **太田胃散A**〈錠剤〉

ストレスによる神経性胃炎・慢性胃炎に **太田漢方胃腸薬II** (顆粒・錠剤タイプがあります)

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」

☎ (03) 3944-1311 (代表)

受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日等を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2

<https://www.ohta-isan.co.jp/>



太田胃散HP