

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

3つの働きで
胃さわやか

食べすぎ・飲みすぎ・胃もたれに

バランスー胃腸薬

第2類医薬品

〈消化酵素配合胃腸薬〉

- ◆バランスー胃腸薬は、消化酵素、健胃生薬、制酸剤を配合した胃腸薬です。
- ◆消化酵素が消化を助け、健胃生薬が胃腸機能を調節して、食べすぎ、飲みすぎ、胃もたれを改善します。
- ◆清涼感のあるスッキリとした服用感です。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

① 次の人は服用しないでください

透析療法を受けている人。

② 長期連用しないでください



相談すること



① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 次の診断を受けた人。

腎臓病

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、下痢

④ 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

食べすぎ、飲みすぎ、胃もたれ、消化不良、消化促進、胸やけ、胃痛、胃酸过多、胃部不快感、げっぷ、胃部・腹部膨満感、胃重、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、胸つかえ、嘔吐、食欲不振(食欲減退)、胃弱



用法・用量

次の量を食間又は食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年令	成人(15才以上)	11~14才	8~10才	5~7才	3~4才	3才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと
服用回数	1日3回					

[注意] (1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

食間の服用は、食事の後2~3時間を目安にします

成 分

1包(1.2g)中

成 分	分 量	はたらき
消化酵素	ビオチアスターゼ2000 プロザイム6 リバーゼAP6	30mg 6.7mg(3包中20mg) 30mg
健胃生薬	ケイヒ末	133.3mg(3包中400mg)
	ショウキョウ末	15mg
	ソウジュツ末	15mg
	コウボク末	15mg
	チンピ末	15mg
制酸剤	合成ヒドロタルサイト 炭酸水素ナトリウム	300mg 150mg

添加物:D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロビルセルロース、L-メントール、香料、プロピレングリコール、カルメロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ポリソルベート80、タルク、二酸化ケイ素

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



治療のポイント

本剤を服用されるほか、日常生活においても次の点にご注意ください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

株式会社パナケイア製薬

富山県高岡市中田4576番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)