服用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

胃　腸　薬

イスナ胃腸薬顆粒S

第2類医薬品

刺激と緊張が続く現代生活において、“ストレス”や、“精神的過労”により胃や腸を支配する神経は常に興奮し、そのため胃や腸は、不快症状がつぎつぎと発症します。
イスナ胃腸薬顆粒Sは、胃腸の不快症状の改善に必要な、消化、健胃、制酸剤を配合した新しい胃腸薬です。
イスナ胃腸薬顆粒Sは、緑色と茶色の溶けやすい顆粒で飲みやすく、次のような特徴があります。

イスナ胃腸薬顆粒Sの特徴

1．消化剤が食べ物の消化を助けます。
2．健胃剤が弱った胃の働きを活発にします。
3．制酸剤があれた胃粘膜を保護し、胃痛やはきけを和らげます。

⚠使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1．次の人は服用しないでください
　透析療法を受けている人。
2．本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
　胃腸鎮痛鎮痙薬
3．授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
　（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）
4．長期連用しないでください

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
　(1)　医師の治療を受けている人。
　(2)　妊婦又は妊娠していると思われる人。
　(3)　高齢者。
　(4)　薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
　(5)　次の症状のある人。
　　排尿困難
　(6)　次の診断を受けた人。
　　腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ

3．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
　口のかわき、便秘、下痢
4．２週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

（裏面もお読みください）

【効　能・効　果】

食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振、胃もたれ、胃弱、胃重、胃部不快感、胃部膨満感、胃痛、胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

【用　法・用　量】

次の量を食前又は食後あるいは食間注) に服用してください。

年　　令	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1　包	1日3回
11才以上15才未満	2/3　包	
8才以上11才未満	1/2　包	
5才以上8才未満	1/3　包	
3才以上5才未満	1/4　包	
3才未満	服用しないでください	

注) 食間とは食事と食事の間をさします。食事の後2～3時間を目安にしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成　分・分　量】

3包中(1包1.2g)

成　分	分量	はたらき
水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物	900mg	過剰な胃酸を中和し、胃痛、胸やけなどの過酸症状を改善します。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg	
沈降炭酸カルシウム	450mg	
ロートエキス散20%(ロートエキスとして30mg)	150mg	胃酸の分泌を抑え、胃痛を鎮めます。
カンゾウ末	240mg	あれた胃粘膜を修理・修復します。
ケイヒ末	500mg	弱った胃腸のはたらきを活発にします。
ビオヂアスターゼ2000	30mg	糖質、たんぱく質を消化します。
プロザイム6	6mg	たんぱく質を消化します。
リパーゼAP6	45mg	脂肪を消化します。
アルジオキサ	150mg	あれた胃粘膜を修復するとともに保護します。

添加物：D-マンニトール、結晶セルロース、トレハロース、カルメロース、銅クロロフィリンナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、l-メントール、デキストリン、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ポリソルベート80、タルク、軽質無水ケイ酸、アルコール、プロピレングリコール、香料

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。)。

(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求め先又は下記にお願い申し上げます。
小林薬品工業株式会社　お客様相談室
電話：058-278-3933
受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度
電話：0120－149－931

発　売　元　**小林薬品工業株式会社**　東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
製造販売元　**株式会社パナケイア製薬**　富山県高岡市中田4576番地

4FL-16LS