

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

複合胃腸薬

第2類医薬品

イスロンGⅡ

イスロンGⅡの特徴

- 消化をたかめ、食欲がでます。
- 胃粘膜を保護し、制酸力があります。
- 胃をストレスからまもり、痛みを和らげます。

〔イスロンGⅡの効果〕

- 消化不良……消化酵素、健胃生薬の配合により、胃の働きが活発になり、食物がよく消化されて、胃の負担を軽くし、栄養として吸収されます。
- 胃痛……胃酸の分泌を抑え、痛みを和らげます。
- 胸やけ、胃酸過多……制酸薬が配合されているので、胸やけ、げっぷなど不快な過酸症状を和らげます。
- はきけ、食欲不振……不快な気分を解消して、おいしく食事がいただけるように、胃の働きを正常にします。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

- 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
- 2週間間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面もよくお読みください。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、げっぷ(おくび)、胃酸過多、胃部不快感、胃痛、胃重、消化促進

【用法・用量】

次の量を、食後に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8 歳以上11歳未満	1/2包	
5 歳以上 8 歳未満	1/3包	
3 歳以上 5 歳未満	1/4包	
3歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】


1日量（3包3.6g）中

成 分	分 量
ジアスメン	50mg
ピオチアスターゼ	100mg
ウルソデオキシコール酸	60mg
ロートエキス3倍散	90mg (ロートエキス30mgに相当)
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	750mg
炭酸マグネシウム	600mg
沈降炭酸カルシウム	315mg
ケイヒ末	200mg

添加物として、乳糖水和物、チョウジ、コショウ、ニクズク、銅クロロフィリンNa、クロスカ
ルメロースNa、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム（L-フェニルア
ラニン化合物）、グリシン、DL-アラニン、クエン酸水和物、l-メントール、ポリオキシエチレ
ンポリオキシプロピレングリコール、バレイシヨデンプン、乳酸Ca、デキストリン、プロピレ
ングリコール、バニリン、香料を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、
2日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの店、または下記にお願いします。
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10
☎076(421)5531 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

**発売元**
富山めぐみ製薬株式会社
富山県富山市三番町3-10

製造販売元
株式会社 パナケイア製薬
富山県高岡市中田4576番地

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)