

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 複合胃腸薬

### 第2類医薬品

# タブローンMⅡ

## ⚠️使用上の注意

### ❌してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸痛鎮痛薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。  
排尿困難  
(6)次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

### 【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、げっぷ(おくび)、胃酸過多、胃部不快感、胃痛、胃重、消化促進

裏面もよくお読みください。

## 【用法・用量】

次の量を、食後に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
3歳以上5歳未満	1/4包	
3歳未満	服用しないでください	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】

1日量（3包3.6g）中

成 分	分 量
ジアズメン	50mg
ピオチアスターゼ	100mg
ウルソデオキシコール酸	40mg
ロートエキス3倍散	90mg (ロートエキス30mgに相当)
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	750mg
炭酸マグネシウム	600mg
沈降炭酸カルシウム	315mg
ケイヒ末	200mg

添加物として、乳糖水和物、チョウジ、コショウ、ニクズク、銅クロロフィリンNa、クロスカルメロースNa、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、グリシン、DL-アラニン、クエン酸水和物、l-メントール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、バレイショデンプン、乳酸Ca、デキストリン、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



## ■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの店、または下記にお願いします。  
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10  
☎076(421)5531 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元  
 富山めぐみ製薬株式会社  
富山県富山市三番町3-10

製造販売元  
株式会社パナケイア製薬  
富山県高岡市中田4576番地