

胃腸薬

キャベジン^α

胃は、もたれや胃重、胃痛など、いろいろなサインで不調を知らせてきます。このような症状は、脂肪分の多い食事や食べ過ぎ・飲み過ぎなどといった過度の物理的負担や、ストレスに伴う精神的負担、加齢による機能低下など、様々な要因によって胃が弱っていくことで起こります。

キャベジン^αは、荒れて傷んだ胃の粘膜を修復し、正常な状態に整えるキャベジン本来の効きめに加え、胃の運動を促進する生薬成分ソヨウなどにより、弱った胃の働きを取り戻していく胃腸薬です。

毎食後1日3回の服用で胃が元気に働くようになり、胃の不快感にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

🗣 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

用法・用量

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	
8歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方: 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量(6錠中)

●メチルメチオニンスルホニウムクロリド.....	150.0mg	●ソヨウ乾燥エキス.....	30.0mg
●炭酸水素ナトリウム.....	700.0mg	(ソヨウとして 270.0mg)	
●炭酸マグネシウム.....	250.0mg	●センブリ末.....	30.0mg
●沈降炭酸カルシウム.....	1200.0mg	●ビオチン.....	24.0mg
●ロートエキス3倍散.....	90.0mg	●リパーゼAP12.....	15.0mg
(ロートエキスとして 30.0mg)			

[添加物] ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、カルメロースCa、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、セラック、タルク、ケイヒ、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、セルロース、二酸化ケイ素、l-メントール、デキストリン

<成分・分量に関連する注意>

メチルメチオニンスルホニウムクロリドなどが配合されていますので、特有のニオイがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) PTPのアルミ箔が破れたり、中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。
- (5) 外箱の「開封年月日」記入欄に、アルミ袋(内袋)をあけた日付を記入してください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度アルミ袋(内袋)をあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間: 月~金(祝日を除く) 9:00~17:00

