

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

クミアイ胃散

胃は毎日の食物を消化してくれる極めて重要な器官であるにもかかわらず、食べ過ぎ、飲み過ぎ、間食、運動不足或いは過度のストレスなどによって知らず識らずのうちに障害を受けやすく、不快な日常を過ごしておられる方も多いことと思います。常に胸がやけてスッパイおくびが出る人、胸がつかえて食欲のない人などは充分注意してください。クミアイ胃散は胃酸過多や食べ過ぎにともなう胸やけ、げっぷ又は胃弱にともなう胸つかえ、食欲不振、消化不良、胃痛、胃部不快感などにすぐれた効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の診断を受けた人。 腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢

成分・分量 1日量(3.9g)中

炭酸水素ナトリウム ……1,200mg	ショウキョウ末 ……45mg
沈降炭酸カルシウム ……750mg	ゲンチアナ末 ……75mg
ノイシリン ……750mg	トウヒ ……45mg
(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	ウイキョウ ……60mg
ケイヒ末 ……270mg	アカメガシワ末 ……165mg

※添加物としてトウモロコシデンプン、香料を含有する。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃痛、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ

用法・用量

1日3回、食後に服用する。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	1.3g(添付のサジに一杯)	3回
15才未満	服用しないこと	

(1) 用法・用量を厳守すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 国産薬品工業株式会社 お客様相談室
☎ 0120-31-3430
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元  厚生連

製造販売元 国産薬品工業株式会社
岐阜市秋沢370番2