

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

クミアイ胃腸錠

第2類医薬品

クミアイ胃腸錠は、胃腸の不快症状にすぐれた効果をあらわす胃腸薬で、次のような特徴があります。

◎胃の負担を軽くする消化酵素

本品の消化酵素は、でんぷん質を速やかに糊状にして、胃の負担を軽くする糊精化力にすぐれたピオチアスターゼを配合し、食べ過ぎや胃のもたれを速やかに改善します。

◎胃の働きを盛んにする健胃生薬

胃のためによい芳香性、辛味性及び苦味健胃生薬を組み合わせて配合しました。これら生薬の独特な香りや味が、口の粘膜や胃壁を刺激して、唾液・胃液など消化液を促し、食欲不振・消化不良など消化機能が低下した胃の働きを助けます。

◎胃の調子を整える制酸剤

制酸剤は、早く胃液を中和する速効性制酸剤と、長く一定の酸度に保つ持続性制酸剤を組み合わせて、胃内の酸度を調整し、また荒れた胃壁を保護します。



使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと

透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の胃腸薬、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

（母乳中に移行して乳児の脈が速くなることがある）

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。 排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、便秘、下痢

4.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【その他の注意】

母乳が出にくくなることもある。

効能・効果

食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、食欲不振、消化不良、胸つかえ、胃酸過多、胃弱、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、げっぷ(おくび)、胃部不快感、消化促進、胃痛、胃部・腹部膨満感、胃重、嘔吐

用法・用量

1日3回、食後に服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|------------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 5錠 | 3回 |
| 11才以上15才未満 | 4錠 | |
| 8才以上11才未満 | 3錠 | |
| 5才以上8才未満 | 2錠 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |

(1)用法・用量を厳守すること。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1日量(15錠)中

ビオチン 300mg

メタケイ酸アルミン酸マグネシウム
720mg

炭酸水素ナトリウム 900mg

沈降炭酸カルシウム 450mg

ロートエキス5倍散 120mg

添加物としてトウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

黄柏末(オウバク末) 60mg

黄芩末(オウゴン末) 60mg

桂皮末(ケイヒ末) 270mg

ゲンチアナ末 75mg

生姜末(ショウキョウ末) 45mg

赤芽柏末(アカメガシワ末) 165mg

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)配置期限内にご使用ください。

お問い合わせ先

国産薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-313-430

受付時間：9時から17時まで

(土、日、祝日を除く)

発売元

●/▲ 厚生連

製造販売元

国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370番2