

この説明書は、服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

はきけ・胃の痛み

**ロミノン三宝<sup>®</sup>OZ**

第2類医薬品

【胃腸鎮痛鎮痙薬】

「胃の痛み」、「腹痛」、「はきけ」などは日常多くみられる症状です。これらの原因には暴飲暴食や精神的・肉体的原因など数多くありますが、単に痛みなどを取り去れば良いというものばかりではありません。しかし、医師にかかる前にこれらの症状をやわらげる必要がある場合があります。

ロミノン三宝OZは、胃粘膜に対して直接的に作用し、鎮痛効果のある「オキセサゼイン」が成分で、「胃の痛み」、「腹痛」、「はきけ」などを抑えます。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 15才未満の小児。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬

#### 3. 長期連用しないでください



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 高齢者。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛、めまい、脱力感

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘

#### 4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

胃痛、腹痛、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、さしこみ（せんつう 疝痛、しゃく 瘕）、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、げっぷ（おくび）

## ■ 用法・用量

1日3回まで、次の量を服用してください。なお、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回量
成人（15才以上）	2錠
小児（15才未満）	服用しないこと

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)服用にあたっては、かまずに速やかに飲み込んでください。  
(成分がとけ、口内にしびれを残さないために)
- (3)「胃の痛み」や「はきけ」などを感じた時は、いつでも服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。
- (4)錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



### 【服用時のアドバイス】

- 胃潰瘍の時は食事をした後に胃が痛む事が多く、十二指腸潰瘍の時は空腹の時に痛む事が多いとされています。
- 胃潰瘍や十二指腸潰瘍の他にも、胃の痛みや腹痛を起こす病気は多いものです。痛みが長く続くようなら、医師の診察を受けてください。

## ■ 成分と働き


成人（15才以上） 1回量2錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	含量	働 き
オキサセジン	5mg	胃粘膜に直接的に作用して、胃の痛み、腹痛、はきけなどを抑えます。

添加物として、セルロース、リン酸水素Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、CMC、ケイ酸Al・ヒドロキシプロピルスターチ・セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含んでいます。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## ■ お問い合わせ先

本剤の服用により、何が変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。  
三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100  
月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



発売元  
**三宝製薬株式会社**  
東京都新宿区下落合2-3-18



製造販売元  
**ジェピーエス製薬株式会社**  
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1