

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

食べ過ぎ・もたれ／消化・整腸（乳酸菌・ビタミンB群・カルシウム塩配合）

チアトミンG錠

第3類医薬品

【複合胃腸薬】

いろいろな食物からバランスよく栄養をとることは、健康の基本ですが、それには体内に取り込まれた食物が円滑に消化され、吸収されて、体に必要な栄養となることが大切です。しかし、現代の生活では食品の多様化や不規則な食事などによって、かえって栄養のバランスがとりにくくなっています。また、さまざまなストレスや疲労などが要因で食物の消化、吸収、排泄の過程がうまくいかず、不健康になりがちです。

チアトミンG錠は3大栄養素の消化酵素と乳酸菌の働きによって、衰えた消化・吸収作用を助け、腸の働きを整えると共にビタミンB群を補給し、さらに、日本人には不足しがちなカルシウム塩を配合した複合胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

- 消化促進、消化不良、食欲不振、食べ過ぎ、もたれ、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感
- 整腸（便通を整える）、軟便、便秘

■ 用法・用量

1日3回、食後に次の量を服用してください。

年 齢	1回量
15才以上	4錠
8才～15才未満	2錠
5才～8才未満	1錠

【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を守ってください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【服用時のアドバイス】

- 食物はよく噛んで食べることが非常に大切です。

- 食べ過ぎないようにし、又、食事はできるだけ規則正しくとるようにして、胃に負担をかけ過ぎないように注意してください。
- 刺激性の強い飲食物や消化の悪いものは、できるだけさけてください。
精神的な疲労を早く回復させるように努めてください。
- 本剤の服用により、まれに尿が黄色になる場合もありますが、これはリボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)によるもので、心配はありません。



成分と働き


1日量(15才以上)12錠中に次の成分を含んでいます。

分類	成分	含量	働き
消化酵素	ピオチアスターゼ1000	48mg	炭水化物、蛋白質、脂肪の3次元養素の消化を助けます
	プロザイム6	15mg	
	パンクレアチン	420mg	
	リパーゼAP6	60mg	
乳酸菌	ラクトミン	30mg	腸内細菌を整えます。
ビタミンB群	チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB ₁)	3mg	新陳代謝を活発にします。
	リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB ₂)	4mg	
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	15mg	
	ニコチン酸アミド	5mg	
カルシウム塩	リン酸水素カルシウム	840mg	胃酸を中和し、胃壁の刺激を減らし、カルシウム塩を補給します。
その他	乾燥酵母 コンブ末	240mg 240mg	栄養の補給をします。

添加物として 酵母、コンブ、ケイ酸Al、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00(祝祭日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18