

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品



胸やけ、胃痛、食欲不振に

## 新・ウイサン<sup>®</sup>胃腸薬N

生活環境の複雑化に起因する不規則な食生活、精神的・肉体的疲労、ストレス等によって、胃腸の不調、機能の衰え等が起こりがちです。

新・ウイサン胃腸薬Nは、制酸剤と健胃生薬をそれぞれ3種、さらに胃粘膜保護剤を2種配合することにより、胸やけ、胃痛、食欲不振、飲み過ぎ、食べ過ぎ等にすぐれた効果を発揮する、胃にさわやかな緑の胃ぐすりです。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい  
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい



#### 【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 次の診断を受けた人  
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### 【効能効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)

## 【用法用量】

次の量を食後に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないこと	

### <用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。


## 【成分分量】 3包(成人1日量)中

成 分	分 量	はたらき
ケイ酸アルミン酸 マグネシウム	1000mg	持続性のある制酸剤と速効性のある制酸剤の組み合わせにより、出すぎた胃酸をすばやく中和し、その効果が持続します。
炭酸水素ナトリウム	700mg	
沈降炭酸カルシウム	500mg	
センブリ末	5mg	芳香、苦味健胃剤として胃の働きを活発にし、食欲不振や消化不良に効果をあらわします。
ケイヒ油	12mg	
チョウジ油	9mg	荒れた胃粘膜を修復・保護します。
アルジオキサ	66mg	
グリチルリチン酸 二カリウム	45mg	

添加物としてL-メントール、ポピドン、ケイ酸Ca、トウモロコシデンプン、銅クロロフィリンNaを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限内に服用して下さい。



### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電 話：(0748) 88-3180 (大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



**滋賀県製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879