

## 第2類 医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

# トキワ胃腸薬グリーン

トキワ胃腸薬グリーンは、現代の食生活に対応できるようにつくられた胃腸薬です。

### 特長

- 各種制酸剤を組み合わせ、速効性かつ持続性の制酸作用と、胃粘膜保護作用を有します。
- 糖質およびたんぱく質の消化に加えて、脂質の消化も助けます。
- 各種健胃生薬の作用により、弱った胃腸の働きを助け、その機能を回復させます。
- 緑と褐色の二色散剤で、味と香りがよく、サラサラとした舌ざわりで、のみやすくなっています。



### 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の方は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

### 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

(必ず裏面もお読みください)

## 用法・用量

次の量を食後、水または温湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法：用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**成分・分量** 1日量(3包)中 1包1,200mg

成分	分量	はたらき		
制酸剤	合成ヒドロタルサイト メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	600mg 450mg	速効性・持続性の制酸作用があり、 胃の粘膜の炎症面を保護する働きも あります。	
	炭酸水素ナトリウム	600mg	速効性の制酸作用があり、胃酸過多 や胸やけなどを改善します。	
	ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして30mg)	90mg	胃酸の分泌をおさえて、胃痛をやわ らげる生薬です。	
	消化 酵素剤	ピオチアスターゼ2000 リパーゼAP6	60mg 60mg	胃腸内の広いpH域で働く消化酵素です。 糖質やたんぱく質の消化を助けます。 脂質の消化を助ける酵素です。
健生 胃薬	ウイキョウ末 ケイヒ末 チョウジ末	30mg 180mg 30mg	生薬の特有の芳香が胃の働きをよく して、消化を促進します。	
	ゲンチアナ末 センブリ末	90mg 5mg	生薬の特有の苦味が胃の働きをよく して、消化を促進します。	
	粘 膜 修 復 剤	カンゾウ末 銅クロロフィリンナトリウム	150mg 48mg	胃の粘膜を保護、修復します。

添加物：カルメロース、アラビアゴム、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ステアリン酸ポリオキシド、デキストリン、バレイシヨデンブ、香料(1-メントール)

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウム(緑色)により、便が緑色になることがあります。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)分割して残った薬は、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用してください。
- (5)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせは  
常盤薬品工業株式会社  
お客さま相談室0120-875-710まで  
受付時間 9:00~17:00 (土、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
0120-149-931

発売元 常盤薬品工業株式会社  
神戸市中央区港島中町6-13-1  
NOEVIR GROUP

製造販売元 東亜薬品株式会社  
富山県富山市水橋開発277番10

TOAG804

05