

この説明文書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

胃の痛み・胸やけ・飲み過ぎ

グリーン胃腸薬

和漢生薬配合

第2類医薬品

グリーン胃腸薬は、現代の食生活に対応できるようつくられた胃腸薬で、次のような特長があります。

- ・たんぱく及びでんぶんの消化力に加えて、脂肪の消化力を高めています。
- ・各種制酸剤を組み合わせ、速効性かつ持続性の胃酸調整効果と、強い胃粘膜保護作用を有します。
- ・各種健胃生薬の作用により、弱った胃腸の働きを助け、その機能を回復させます。
- ・緑と褐色の二色散剤で、味と香りがよく、サラサラとした舌ざわりでのみやすくなっています。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。排尿困難
(6)次の診断を受けた人。胃臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

次の量を食後に水又は温湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上 8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないでください。	

〔用法・用量に関連する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

1日量（3包）中

（1包量1200mg）

成 分		分量	作 用
制酸剤	合成ヒドロタルサイト メタケイ酸アルミン酸マグ ネシウム	600mg 450mg	持続的な制酸作用を有し、かつ胃粘膜の炎症面を保護する働きもあります。また合成ヒドロタルサイトは速効性もかね備えています。
	炭酸水素ナトリウム	600mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。
	ロートエキス3倍散 （ロートエキスとして30mg）	90mg	鎮痙鎮痛作用があり、胃の異常な緊張をしずめ、胃の機能を正常にし、胃腸の痛みを抑えます。また胃酸の分泌を抑制します。
消 化 酵 素 剤	ビオチアスターゼ2000	60mg	広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の補給をよくします。
	リパーゼAP6	60mg	脂肪消化酵素で、強力な消化作用をあらわします。
健 生 胃 薬	ウイキョウ末 ケイヒ末 チョウジ末	30mg 180mg 30mg	芳香性の健胃生薬で、特有の芳香が味覚を刺激し、食欲を増進させ、また胃腸の働きをよくします。
	ゲンチアナ末 センブリ末	90mg 5mg	苦味健胃生薬で上と同様の作用があります。
	粘 膜 修 復 剤	カンゾウ末 銅クロロフィリンナトリウム	150mg 48mg

添加物：カルメロース、アラビアゴム、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイシヨデンブ、デキストリン、乳糖、ステアリン酸ポリオキシル、*l*-メントール

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウム（緑色）により、便が緑色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
 東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室
 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
 電 話：076-478-5580
 受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）