

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保存してください。

胃酸過多、胸やけ、消化不良、食べ過ぎ、二日酔いのむかつきに

第2類医薬品

胃腸薬

保寿胃腸薬

保寿胃腸薬は過剰な胃酸を中和し、胸やけ等の不快な症状を改善する制酸剤に、食物の消化を助け胃腸の負担を軽くする消化剤を配合し、弱った胃腸を元気にする多くの健胃生薬を配合した胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

（裏面もよく御覧ください）

【有効成分】 1日量(3g)中

炭酸水素ナトリウム	……1380mg	ウイキョウ末	……60mg
重質炭酸マグネシウム	……450mg	ダイオウ末	……75mg
沈降炭酸カルシウム	……600mg	ケイヒ末	……90mg
カンゾウ末	……135mg	ゲンチアナ末	……45mg
ビオチン	……75mg	ショウキョウ末	……60mg

添加物としてℓ-メントール、ニクズク末含有。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ(過食)、消化促進、食欲不振(食欲減退)、消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上(大人)	1g	3 回
11才以上15才未満	2/3g	
8才以上11才未満	1/2g	
5才以上8才未満	1/3g	
5 才 未 満	服用させないでください。	

いずれも1日3回食後水又は白湯にて服用してください。

(添付のさじにすり切り1杯は約1gです)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本品についてのお問い合わせ先 富山薬品株式会社
お客様相談窓口 ☎(076) 435-0139
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175