

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保存してください。

胃酸過多、胸やけ、消化不良、食べ過ぎ、二日酔いのむかつきに

第2類医薬品

胃腸薬 富山胃腸薬

富山胃腸薬は過剰な胃酸を中和し、胸やけ等の不快な症状を改善する制酸剤に、食物の消化を助け胃腸の負担を軽くする消化剤を配合し、弱った胃腸を元気にする多くの健胃生薬を配合した胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
 - 2. 長期連用しないこと

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【有効成分】 1 日量(3g)中

炭酸水素ナトリウム	1380mg	ウイキョウ末	60mg
重質炭酸マグネシウム	450mg	ダイオウ末	75mg
沈降炭酸カルシウム	600mg	ケイヒ末	90mg
カンゾウ末	135mg	ゲンチアナ末	45mg
ビオヂアスターゼ1000	75mg	ショウキョウ末	60mg
(芳香剤) ℓ-メントール	15mg	(矯味剤)ニクズク末	15mg

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ(過食)、消化促進、食欲不振(食欲減退)、消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15才以上（大人）	1 g	3 回
11才以上15才未満	2/3g	
8 才以上11才未満	1/2g	
5 才以上 8 才未満	1/3g	
5 才 未 満	服用させないでください。	

いずれも 1 日 3 回食後水又は白湯にて服用してください。

(添付のさじにすり切り 1 杯は約 1 gです)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)透析療法を受けている人は服用しないでください。
- (2)服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (3)服用に際しては、説明書をよく読んでください。
- (4)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (5)小児の手の届かない所に保管してください。

本品についてのお問い合わせ先 富山薬品株式会社
お客様相談窓口 ☎(076)435-0139
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175