



ゼリア新薬

消化酵素配合胃腸薬

ストマーゼ® 顆粒

STOMASE Granule

〔特 徴〕

胃は健康の源です。食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良や生活環境の複雑化に起因するストレス、精神的疲労・不安などによって胃の不調、不快感、機能の衰えなどが起こりがちです。

ストマーゼ顆粒は、こうした症状の改善に働く消化酵素剤、健胃生薬を配合した、のみやすい顆粒状の胃腸薬です。



〔食べ過ぎ〕



〔胃もたれ〕



〔胸やけ〕

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 透析療法を受けている人。
(2) フェニルケトン尿症の人。
2. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

【効能・効果】

消化促進，食べ過ぎ（過食），飲み過ぎ（過飲），もたれ（胃もたれ），消化不良，胃重，胃部膨満感，消化不良による腹部膨満感，胃部不快感，食欲不振（食欲減退），胸やけ，胸つかえ，嘔吐，はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心），胃痛，胃酸過多，げっぷ（おくび）

【用法・用量】

年齢	1回量	用法
成人（15才以上）	1包	1日3回，食後に服用してください。
11才以上 15才未満	2/3包	
8才以上 11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
3才以上 5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください。	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。

【成分】1日量（3包）中

成分	分量	はたらき
ピオチアスターゼ2000	40mg	でんぷん及びたん白質を消化します。
ニューラーゼ	90mg	たん白質及び脂肪を消化し，栄養の吸収を促進します。
リパーゼA P 6	60mg	脂肪を消化します。
ウルソデオキシコール酸	15mg	脂肪を乳化し，吸収を助けます。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	600mg	胃内の過剰な酸を中和したり，胃粘膜を保護します。
水酸化マグネシウム	300mg	
ガジュツエキス （ガジュツ300mgに相当）	15mg	特有の芳香と味が消化液の分泌を活発にし，食欲を増し，消化を良くし，胃の働きを整える健胃生薬成分です。
ケイヒ油	4mg	
ハッカ油	4mg	

添加物：乳糖水和物，トウモロコシデンプン，カルメロースカルシウム，ポビドン，D-ソルビトール，アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物），ヒドロキシプロピルセルロース

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割して服用した残りは，袋の口を折り返して保管し，2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9：00～17：50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ストマーゼはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



発売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元
日新製薬株式会社
山形県天童市清池東二丁目3番1号